
## Enquête Démographique et de Santé du Benin (EDSB- IV) 2011-2012

### **Planification Familiale**

L'utilisation des méthodes contraceptives modernes par les femmes en union a augmenté légèrement, passant de 6 % en 2006 à 8 % en 2011-2012. Le condom masculin et les injectables sont les méthodes les plus utilisées.




# © 2007 Katherine Echeverria, avec la permission de Photoshare

### Santé de l'enfant

Près de la moitié des enfants de 12-23 mois (48 %) sont complètement vaccinés. La couverture vaccinale n'a pas changé depuis 2006 et elle n'a pas retrouvé le niveau qui prévalait en 2001 (59 %).

La proportion d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin a augmenté depuis 2006. En 2011-2012, un enfant sur dix n'avait reçu aucun vaccin.




### Santé de la reproduction

86 % des femmes ont effectué une visite prénatale auprès d'un prestataire formé. La proportion des dernières naissances protégées contre le tétanos néonatal a augmenté, passant de 59 % en 2006 à 70 % en 2011-2012.

La proportion des naissances assistées par un prestataire formé a augmenté, passant de 64 % en 1996 à 84 % en





### **Paludisme**

\*les médecins, infirmières, sages-femmes, aidessoignantes, et les assistates accoucheuses

La possession et l'utilisation des moustiquaires préimprégnées d'insecticide (MII) ont augmenté sensiblement depuis 2006.

En 2011-2012, 80 % des ménages possèdaient une MII et environ trois quart des enfants et femmes enceintes (respectivement 70 % et 75 %) avaient dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête.

